

Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία ή μήπως όχι; Αφαντενού Σεβαστή, Τσιατούρα Αμαλία

Cosmetic Derma Medicine & Advanced Hair Clinics, Αθήνα, Ελλάδα

Εισαγωγή

Η κεντρική φυγόκεντρος αλωπεκία (central centrifugal cicatricial alopecia-CCCA) είναι μια φλεγμονώδης ουλωτική αλωπεκία που εμφανίζεται συνήθως σε γυναίκες Αφρο-Αμερικάνικης φυλής. Παρουσιάζουμε ένα κλινικό περιστατικό CCCA σε άνδρα Καυκάσιας φυλής που αντιμετωπιζόταν ως ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία.

Ιστορικό

Φύλο: Άρρεν
Φυλή: Καυκάσια
Ηλικία: 40 ετών
Διάρκεια βλαβών: Άγνωστη
Κύριο σύμπτωμα: Εκτεταμένη απώλεια τριχών στην κορυφή του τριχωτού της κεφαλής

Κλινική εικόνα

- Στίλβουσα περιοχή με ατροφία
- Μεμονωμένες τρίχες στο σημείο της ουλωτικής περιοχής
- Εντόπιση: Κορυφή τριχωτού κεφαλής

Ιστοπαθολογία

Θέση λήψης βιοψίας:

- Όρια ενεργούς βλάβης

Αποτελέσματα βιοψίας:

- **Ομόκεντρη πεταλοειδή ινοπλασία** στο ύψος του ανώτερου τμήματος του ισθμού της τρίχας
- **Λεμφοκυτταρική φλεγμονώδη** διήθηση γύρω από την χοάνη της τρίχας

Θεραπεία

- **Clobetasol propionate** 0,05% 2 φορές/ημέρα για 6 εβδομάδες με σταδιακή μείωση
- **Minoxidile** 5% 1 φορά/ημέρα
- Συμπληρωματική θεραπεία: Τοπική χορήγηση αναστολέων καλσινευρίνης

Διαφορική διάγνωση

CCCA

- Ουλωτική αλωπεκία
- Μεμονωμένες εύθρυπτες τρίχες ανάμεσα στην ουλωτική περιοχή
- Εντόπιση : Κορυφή τριχωτού
- Πορεία νόσου: Συμμετρική, ακτινωτή
- Συμπτώματα: Ευαισθησία, κνησμός, αίσθημα καύσου
- Συνύπαρξη άλλων βλαβών: Βλατίδες, φλυκταινίδια

Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία

- Μη ουλωτική αλωπεκία
- Χνοώδης μετατροπή των τριχών
- Απουσία στοιχείων φλεγμονής
- Εντόπιση: Αμφικροταφική, βρεγματική περιοχή και κορυφή τριχωτού κεφαλής
- Πορεία νόσου: Διάχυτη απώλεια τριχών
- Συμπτωματολογία: Ασυμπτωματική

Συμπεράσματα

- Η CCCA συνήθως προσβάλλει γυναίκες Αφρο-Αμερικάνικης φυλής
- Επίπτωση: 2.7-5.7%
- Αιτιοπαθογένεια:
 1. Γενετικοί παράγοντες
 2. Έλξη
 3. Χημικοί παράγοντες
- Η CCCA σπάνια προσβάλλει άντρες
- Μόνο 12 περιπτώσεις έχουν αναφερθεί
- Η CCCA θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη δ.δ σε ασθενείς με απώλεια τριχών στην κορυφή του τριχωτού
- Συνιστώμενες θεραπείες:
 1. Πολύ ισχυρά τοπικά στεροειδή
 2. Ενδοβλαβικά στεροειδή
 3. Τοπικοί αναστολείς καλσινευρίνης
 4. Τετρακυκλίνες/δοξυκυκλίνη
 5. Κυκλοσπορίνη
 6. Μεταμόσχευση μαλλιών

Κλινική εικόνα



Εικόνες 1 & 2: Στίλβουσα, ατροφική περιοχή με υπολειπόμενες εύθρυπτες τρίχες ανάμεσα σε αυτές

REFERENCES

1. Dlova NC, Salky KS, Callender VD, McMichael AJ. Central Centrifugal Cicatricial Alopecia: New Insights and a Call for Action. *J Investig Dermatol Symp Proc* 2017;18:S54-S56.
2. Herskovitz I, Miteva M. Central centrifugal cicatricial alopecia: challenges and solutions. *Clin Cosmet Investig Dermatol* 2016;9:175-181.
3. Blattner C, Polley DC, Ferritto F, Elston DM. Central centrifugal cicatricial alopecia. *Indian Dermatol Online J* 2013;4:50-51.