

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ?

Καφρίτσας Γεώργιος 1, Αλεξίου Γεώργιος 1, Πολυμνίου Βάρβαρα², Βούλγαρης Σπυρίδων 1

1.Νευροχειρουργική ΠΓΝΙ

2.Παθολογική Δ Ευαγγελισμός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα υψηλού βαθμού κακοήθειας γλοιώματα αποτελούν τον συχνότερο κακοήθη πρωτοπαθή όγκο εγκεφάλου στους ενήλικες. Υπάρχουν αναφορές ότι η μετεγχειρητική επιμόλυνση του χειρουργικού τραύματος σχετίζεται με την επιβίωση. Παρουσιάζεται η εμπειρία της κλινικής μας.

Υλικό. Τρεις ασθενείς οι οποίοι χειρουργήθηκαν για υψηλού βαθμού κακοήθειας γλοιώμα παρουσίασαν μετεγχειρητικά επιμόλυνση του χειρουργικού τραύματος.

Αποτελέσματα. Τρεις ασθενείς (2 άνδρες, 1 γυναίκα), υπεβλήθησαν σε χειρουργική αφαίρεση γλοιώματος υψηλής κακοήθειας. Δύο έπασχαν από γλοιοβλάστωμα και ένας από αναπλαστικό ολιγοαστροκύτωμα. Οι ασθενείς επαναχειρουργήθηκαν και έλαβαν αντιβιοτική αγωγή. Δύο ασθενείς είχαν επιβίωση 37 και 42 μήνες ενώ ένας είναι εν ζωή.

Συμπέρασμα .Τρεις ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν για γλοιώματα παρουσίασαν μετεγχειρητικές λοιμώξεις οι οποίες αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Ο ρόλος της επιμόλυνσης του τραύματος στην επιβίωση είναι ένα θέμα υπό έρευνα με αντικρουόμενα αποτελέσματα στην βιβλιογραφία.